



## **INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

### **CENTRO DE CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA SANGOLQUI**

Economista, Verónica Aguirre.

Presente.-

Como parte de nuestra campaña por el día mundial del VIH, junto al MSP nuestro Órgano Rector, quienes han profundizado la pertinente publicidad para ser difundida a todos los pacientes y personal que labora en los distintas casas de salud del país, hemos realizado varias charlas donde se enfatizó lo siguiente:

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunitario y debilita los sistemas de defensa contra las infecciones y determinados tipos de cáncer. A medida que el virus destruye las células inmunitarias e impide el normal funcionamiento de la inmunidad, la persona infectada va cayendo gradualmente en una situación de inmunodeficiencia, misma que aumenta el riesgo de contraer numerosas infecciones, cánceres y otras enfermedades potencialmente mortales.

Debemos conocer los antecedentes de VIH en el mundo:

- Desde el apareamiento del VIH, en 1981, casi 75 millones de personas han sido infectadas a escala mundial. Hasta el momento, alrededor de 39 millones de personas han muerto de VIH.
- Se estima que en los países de bajos y medianos ingresos existen 32,6 millones de personas infectadas con VIH, de las cuales 11,7 millones acceden a tratamiento antirretroviral,
- En la región de las Américas el promedio de cobertura de tratamiento antirretroviral es del 44%, y es uno de los más altos a escala mundial.
- La cobertura a nivel pediátrico aún es deficiente a escala global. En el 2013 menos de 1 de cada 4 niños que viven con VIH tienen acceso al tratamiento antirretroviral.
- En 2015, la comunidad global se comprometió con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en poner fin a la epidemia del Sida y reducir el número de infectados con VIH, como problema de salud pública.

¿En qué consiste esta estrategia implementada por el MSP?

El Ministerio de Salud Pública desarrolla una estrategia de eliminación de la transmisión materno infantil del VIH. Entre sus componentes incluye la campaña



## **INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

### **CENTRO DE CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA SANGOLQUI**

de difusión “Tu bebé sin VIH: hazte la prueba”, mismos folletos fueron de gran uso para publicarlo en todo el hospital, para sensibilizar a las mujeres en edad fértil y embarazadas sobre la importancia de la detección oportuna de este virus, al practicarse pruebas de diagnóstico rápidas que se realizan en todos los establecimientos de salud públicos y privados.

Adicionalmente, se ha desarrollado un modelo de diagnóstico, tratamiento y seguimiento para garantizar que todas las mujeres gestantes puedan ser tamizadas y reciban tratamiento en caso de necesidad, lo cual se ha gestionado con el área de Ginecología de nuestra Unidad.

Antecedentes de VIH en el Ecuador, son alarmantes:

- Se tiene un registro histórico hasta la actualidad de 39.224 personas que viven con VIH (PVV).
- La prevalencia de VIH en Ecuador en embarazadas es de 0.18%. La proyección de mujeres embarazadas en 2017 con VIH es de 767.
- Se calcula que la incidencia de VIH en mujeres embarazadas para lo que resta del 2017 es de 767 nuevos casos de VIH en este grupo de población.
- En el país 14.363 personas reciben medicamentos en las 32 unidades de Atención Integral de VIH localizadas en los hospitales del MSP.
- Las personas con VIH se realizan pruebas de control de CD4 y Carga Viral dos veces al año.
- La mortalidad acumulada desde 1984 hasta 2016 es de 17.574 personas.
- Dentro de su Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Ecuador se comprometió a eliminar la transmisión de VIH madre-hijo hasta el 2021, convirtiéndose en una meta del gobierno nacional.

¿Qué queremos lograr como ente de salud y basados en MSP?

Sensibilizar a las mujeres en edad fértil y embarazadas sobre la importancia de realizarse la prueba de VIH para identificar de forma temprana el virus, permite que el Sistema Nacional de Salud, tome acciones de prevención para que, a través del tratamiento adecuado, este virus no se transmita al niño.

El objetivo de esta iniciativa, que arranca a finales del 2017, es convertirnos en un futuro, en uno de los países de las Américas en haber certificado este logro.

La meta es llegar a 2% o menos de niños hasta los 18 meses de edad infectados con VIH, a través de su madre durante el embarazo, parto o lactancia.



## INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

### CENTRO DE CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA SANGOLQUI

Consideramos que para lograr todo esto, no solo debemos enfocarnos en 1 semana del año, sino todos los días del mismo; solo así lograremos rebajar las cifras de contagio a los neonatos.

La concientización de la población y sobretodo de mujeres embarazadas será difícil pero no imposible.

Adjunto Fotografías de lo realizado en nuestra Unidad:





**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**CENTRO DE CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA**  
**SANGOLQUI**







**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**CENTRO DE CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA**  
**SANGOLQUI**



Dra. Victoria Jácome.

Médico Auditor

Coordinador Gestión